## 大白蚁属(Macrotermes)一新种\*

(等翅目: 白蚁科)

朱 检 林 罗 培 烈 (广东省昆虫研究所 广州) (北海市自教助治所 广西)

美體河 白蚁科 大白蚁属 實際大白蚁 广西

宽胸大白蚁 Macrotermes latinotus, sp. nov.

大兵蚊 (图 1. A-F; 表 1)

体大型,头深褐色,胸节色更深,上颚黑色,头、胸毛稀少,腹部背板后缘具毛20 条左右。

头巨大,背观微呈矩形,两侧微弧出,前端收窄,后缘弧形,后角方圆形,侧观背面拱形,额前斜下,腹面圆弧突出。上颚粗壮,左上颚中点后具数个小扇状突起,基部具一深凹,右上颚全部光滑无齿。上唇舌形,长大于宽,尖端具白色半透明两个大小套叠三角块,两侧各具毛 5 条。后唇基隆起。触角17节,节 I 最长,节 I 最短,节 I 大于节 I 2 倍长和节 IV 1.5 倍长。囟纸小,位于背部中点前方。触角窝后下方具线色圆形小眼点。头背具两条深色纵纹从后缘向前伸展。后瓣狭长,稍弯向腹方,前半微露腹外,中部收缩而窗于端部,端部微具白色瓣膜。

前胸背板宽于头宽之半,前部斜向上翘,侧缘枕角向两侧伸展,前、后 缘 中 央 微 凹,中胸背板宽于前、后胸背板,中、后胸背板侧缘间后侧伸展为影角。后缘中央微向 前凹,其余凡成直线。


小兵蚁 (图 2, A-F, 表 1)

体型小于大兵蚁,体色也略淡。

头呈卵圆形,侧缘、后端圆弧突出,中部最宽,前端逐渐变窄,后角宽圆形。头背两条探色似纹从后缘向前伸延到中部。上唇长大于宽,两侧各具毛5条,前端具白色半透明大圆舌块套小三角块。上颚粗壮,镰刀形,左上颚内缘缺刻与大兵蚊近似(见图 2 C);右上颚基部具突起,其余光滑。触角17节,节1最长,接近节 I 1.5 倍,节 I 最短。前胸背板前部微翘,侧缘钝角向两侧伸展,前缘凹陷浅于后缘,中、后胸侧缘圆角伸向两侧,前胸最宽,后胸次之,中胸最狭。

<sup>\*</sup> 本文插图录我所黄静玲同志复量,谨敢谢忱。

本文1982年10月25日牧剪, 1983年19月24日牧剪修改葺。






图 1 宽胸太白戟、新种、M. latinotus, sp. nov. 大兵权。major soldier A. 头部背面 (head, dorsal view) B. 头部模面 (head, lateral view) C. 上颚(mandibles) D. 段領(postmentum, ventral view) E. 上房 (labrum) F. 前、中、后胸背板 (pro—, meso— & metanotum)




Table 1 Measurements of the soldiers of M. latilinatum sp. nov. and M. carbonarius (Hagen)

项目	大吳敏 -	小 吳 軟	
29 13		茂 周 (9个)	正模
<b>£</b> £	14.50	11.09-12.60	11.30
头长连上颚	7.20	5.70-6.10	6.20
头长不差上颚	5.20	4.00-4.40	4.30
头 實	4.25	3.17-3.49	3.27
头宽指数	0.817	0.78-0.81	0.76
班 基 文	2.59	2.05-2.20	2.10
头连侧高	2.78	2.00-2.35	2.10
左上颚长	2.60	1.83-2.03	1.98
后斯米龙	1.098	0.878-0.976	0.927
后期最装	0.85	0.61-0.70	0.61
后賴埃克	0.70	0.51-0.586	0.56
启 頻 长	3.42	2.64-3.07	2.93
上 潛 长	1.23	0.78-1.05	0.854
上 胜 寬	0.854	0.66-0.78	0.78
苗胸青板长	1.24	1.02-1.12	1.02
前胸骨板掌	2.57	2.08-2.24	2.20
中胸背板寬	2.80	1.68-2.00	1.71
后胸背板實	2.44	1.90-2.16	2.00
后胫长	3.42	2.68-2.98	2.93




图 2 宽胸大白蚁、新种 M. latinotus, sp. nov. 小兵蚁 minor soldier

比较,本种兵蚁从体型、体色、大兵蚁中胸最宽等近似M. carbonarius (Hagen)。模式标本,编号6673,大兵蚁(1),小兵蚁(10),1980, I,16,罗培烈采集于广西南宁市郊,保存于广东省昆虫研究所。副模、编号北字0011,采集时间、地点同上,保存于广西北海市白蚁防治所。

## 参考文献

Ahmad, M. 1958 Key to Indomalayan termites. Biologia (Pakistan), 4(1): 84-98
Ahmad, M. 1965 Termites (Isoptera) of Thailand. Bull. Ami. Mus. Nat. Hist. 131(1):30-31

## ON A NEW SPECIES OF MACROTERMES (ISOPTERA: TERMITIDAE)

Zhu Jianlin

Luo Peilie

(Guangdong Institute of Entomology, Guangzhou) (Beihai Control Office of Termite, Guangxi)

Macrotermes latinotus. sp. nov. (Figs. 1-2; table 1)

The soldier of this new species is closely related to *M. carbonarius* (Hagen) by its body size, tinge of corpus, wider mesonotum of major soldier, etc. They can be distinguished from each other as follows:

Body-	Species	M.latinotus	M. carbonarius (Hagen)
<b>Maj</b> or soldier	Anterior half of postmentum	slightly emarginate, unindented  fine striction absent 7.00(mm)	emarginate and
	Head length without mandibles	5.20	(5.18 - 5.32) - 5.60

	Widest of head	4.25	(4.53) - 4.70
	Length of pronotum	1.24	1.33
	Width of pronotum	2.57	(3.02-3.09) - 3.15
	Width of mesonotum	2.86	2.59 - 2.66
	Width of metanotum	2.64	2.58
	Colour of head	reddish brown	almost black
	Head length with	5.70 - 6.20(10)*	(5.02)5.10 - (5.20)
Minor	mandibles		
soldier	Head length without mandibles	4.00 - 4.40(10)	(3.22) - 3.27
	Widest of head	3.17 - 3.49(10)	(2.67)2.74 - (2.75)
	Widest of postmentum	0.878 - 0.976(10)	(0.67)
	Narrowest of post mentum	0.61-0.70(10) (in the middle)	(0.57)
	Width of pronotum	2.08 - 2.24(10)	2.01-(2.08)
	Width of mesonotum	1.66 - 2.00(10)	1.56
	Width of metanotum	1.90 - 2.10(10)	(1.71 - 1.76)

\* Number of specimens is given within brackets

Type, Major soldier(1), minor soldier(10), No.6673, Nanning outskirts, Guangxi, March 16, 1980, collected by Luo pei-lie, deposited in Guangdong Institute of Entomology.

Paratype, Major soldier and minor soldier No. Bei 0011, locatity, the same as type, deposited in Beihai Control Office of Termite, Guangxi.

Key words Termite Macrotermes Latinotus Guangxi